

© Fatma Kacar,  
© Esmâ Erođlu,  
© Arzu Tarakçı,  
© Fatma Derin Çolkesen,  
© Şule Özdemir Armađan,  
© Selver Can

## Vankomisine Dirençli Enterekok Enfeksiyonlarının İrdelenmesi

### Evaluation of Vancomycin Resistant Enterococcal Infections

Geliş Tarihi/Received : 07.05.2020  
Kabul Tarihi/Accepted : 04.08.2020

©Telif Hakkı 2020 Türk Yođun Bakım Derneđi  
Türk Yođun Bakım Dergisi, Galenos Yayinevi  
tarafından yayımlanmıştır.

Uzm. Dr. Fatma Kacar, Esmâ Erođlu, Arzu Tarakçı,  
Fatma Derin Çolkesen, Şule Özdemir Armađan,  
Selver Can  
Konya Eđitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon  
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniđi, Konya,  
Türkiye

Uzm. Dr. Fatma Kacar (✉),  
Konya Eđitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon  
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniđi, Konya,  
Türkiye

E-posta : drkacar42@gmail.com

Tel. : +90 505 872 97 03

ORCID ID : orcid.org/0000-0001-9545-5179

**ÖZ Amaç:** Son yıllarda VRE enfeksiyonları özellikle yođun bakım ünitelerinde sık karşılaşılan nozokomiyal enfeksiyon etkenleri arasındadır. Çalışmamızda hastanemizde yatan hastalardan, hastane enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen enterokokların direnç oranlarının deđerlendirilmesi amaçlanmıştır.

**Gereç ve Yöntem:** .... Hastanesinde beş yıllık süreçte yatan hastalarda enterokoklara bađlı hastane enfeksiyonlarının kaynađı ve direnç oranları retrospektif olarak irdelenmiştir. Bu hastaların belirlenmesinde Yođun Bakım Ünitesi (YBÜ) izlem formları, Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemi (UHESA) verileri dikkate alınmıştır. Hastane enfeksiyonları (HE); "Centersfor Disease Control and Prevention" (CDC) tanı kriterlerine göre tanımlanmış, tüm örnekler konvansiyonel kültür yöntemleri ile deđerlendirilmiştir.

**Bulgular:** Hastanemizde kayda alınan tüm nozokomiyal enfeksiyonlarda (2835) etkenlerin %6,24'ü (177) enterokok spp.'ye bađlı bulundu. Enfeksiyonların %54,8'i (97) YBÜ, %45,2'si (80) servislere yatmakta idi. Enterokokların %57,63'ü (102) idrarda, %27,11'i (48) kanda, %13,56'sı (24) yaranın sürüntü kültürlerinde üredi. Enterokoklara bađlı nozokomiyal enfeksiyon kabul edilen hastaların 7 tanesinde etken VRE idi. VRE oranı tüm (2835) nozokomiyal enfeksiyonlar arasında % 0,24, enterokoklara bađlı nozokomiyal enfeksiyonlar içinde ise; % 3,4 olarak bulundu. VRE enfeksiyonlarının; 1'i kan dolaşımı, 6'sı idrar yolu enfeksiyonu olarak kaydedilmişti. VRE'lerin tümü E. feacium (%100) olarak saptandı. Hastalarda en sık rastlanan risk faktörleri ileri yaş, üriner ve santral venöz kateter kullanımı, ABY veya KBY idi.. VRE enfeksiyonu öncesinde glikopeptid kullanımı %42,85 olup, hastaların %100'ü önceden 3. kuşak sefalosporin kullanmıştı.

**Sonuç:** Enterokokların yol açtığı enfeksiyonlarda etkenlerin izolasyonu, dođru tanımlanması ve antibiyotik duyarlılık-larının belirlenmesi ne kadar öncelikliyse, bu bakterilere ilişkin antibiyotik duyarlılık profillerinin izlenmesi de o denli yaşamsal önem taşımaktadır.

**Anahtar Kelimeler:** Direnç, Hastane enfeksiyonu, VRE

**ABSTRACT Objective:** In recent years, VRE infections are among the common nosocomial infection factors, especially in intensive care units. In our study, it was aimed to evaluate the resistance rates of enterococci, which are isolated as a hospital infection.

**Materials and Methods:** The source and resistance rates of hospital infections due to enterococci were investigated retrospectively in patients hospitalized in .... Hospital in five years. Intensive Care Unit (ICU) follow-up forms, National Hospital Infections Surveillance (NNIS) data were taken into consideration in determining these patients. Hospital infections (HI); "Centersfor Disease Control and Prevention" (CDC) was defined according to diagnostic criteria, all samples were evaluated by conventional culture methods.

**Results:** 6.24% (177) of the factors in all nosocomial infections (2835) recorded in our hospital were linked to enterococcal spp. 54.8% (97) of the infections were in ICU and 45.2% (80) were in the services. 57.63% (102) of enterococci reproduced in the urine, 27.11% (48) in the blood, 13.56% (24) in the swab cultures of the wound. VRE was the cause of 7 of the patients who were accepted nosocomial infections due to enterococci. The VRE rate is 0.24% among all (2835) nosocomial infections and among nosocomial infections due to enterococci; It was found to be 3.4%. All VREs were detected as E. feacium (100%). The most common risk factors in patients were advanced age, urinary and central venous catheters, ABY or CKD. The use of glycopeptides before VRE infection was 42.85%, and 100% of patients had previously used 3rd generation cephalosporins.

**Conclusion:** The more important the isolation, correct identification and determination of antibiotic susceptibility in the infections caused by enterococci, the more vital it is to monitor the antibiotic susceptibility profiles for these bacteria.

**Keywords:** Resistance, Hospital infection, VRE

## Giriş

Enterokoklar zor koşullar altında canlılıklarını sürdürebilen fırsatçı patojenlerdir. Toprak, su, bitki ve yiyeceklerde bulunabilirler. Bu bakterilerin ana konağı insan ve hayvanların gastrointestinal sistemidir. Ayrıca orofaringeal ve vajinal sekresyonlarda, ciltte özellikle de perineal bölgede bulunabilirler. Enterokok enfeksiyonlarının yarısı yoğun bakım ünitelerinde olmak üzere %60'ı nozokomiyaldir. Bütün nozokomiyal enfeksiyonların %10'undan enterokoklar sorumludur. Bakteriyemilerin %9'unda, nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonlarının %16'sında etkendirler. Tüm enterokok enfeksiyonlarının %80-90'ından *E. faecalis*, %10-20'sinden *E. faecium* sorumludur (1). Dış ortamlara dayanıklı olduklarından canlılıklarını uzun süre devam ettirebilirler. Hastanelerde; yatak, kapı kolu, stetoskop vb. üzerinde uzun süre yaşayabilirler, sağlık çalışanlarının elleri ve hastalarda ortak kullanılan malzemelerle ciddi hastane enfeksiyonlarına ve nozokomiyal salgınlara neden olabilirler (3). Avrupa sürveyans verilerine göre, vankomisin dirençli enterokok (VRE) oranları Finlandiya ve Hollanda'da %2'nin altında iken, İrlanda, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerde %20'nin üzerine çıkabilmektedir. Ulusal Sağlık Hizmeti Güvenlik Ağı (National Healthcare Safety Network-NHSN) 2006-2007 raporunda, enterokok türleri ABD hastanelerinde ikinci en yaygın patojen olarak bildirilmiştir. Türkiye'de ilk VRE 1998 yılında, Antalya'da bir üniversite hastanesinde ortaya çıkmış, 1999 yılından sonra VRE saptanan merkez sayısı artmıştır. VRE özellikle büyük hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde infektif endokardit, kan dolaşım enfeksiyonu, üriner sistem enfeksiyonu gibi enfeksiyonlara neden olmaktadır (3). VRE suşları, vankomisin haricinde birçok antibiyotige de dirençlidir. Yatan hastalarda ciddi morbidite ve mortaliteye neden olurlar. Glikopeptid direnci *E. faecium*'da, *E. faecalis*'e göre daha fazladır (4). Sağlık Bakanlığının yayınladığı antimikrobiyal direnç hızları 2010 yılı verilerine göre ülkemizdeki VRE oranı %11.2'dir (5). Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan *E. Faecium*'a bağlı nozokomiyal enfeksiyonların %50'sinin vankomisine, ayrıca bu mikroorganizmaların genelde tedavide kullanılabilecek çoğu antibiyotige de dirençli olduğu bildirilmiştir (6). Çalışmamızda hastanemizde yatan hastalardan, hastane enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen vankomisine dirençli enterokokların yıllara göre dağılımı ve direnç oranlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

## Gereç ve Yöntem

Çalışmamız; 01.01.2015 -31.09.2019 tarihleri arasında hastanemiz yoğun bakım üniteleri, dahili ve cerrahi kliniklerinde yatan hastalarda retrospektif olarak yapılmıştır. Toplam 19 yoğun bakım ünitesi 157 yoğun bakım yatağı olan hastanemizde solid organ nakli, allojenik ve otolog kemik iliği nakli yapılmamaktadır. Hastanemiz hematoloji-onkoloji kliniğinde belirtilen tarihler arasında 4300 hasta takip edildi. 2014 yılı sonuna kadar VRE için tüm yoğun bakımlardan, nütropenik hastalar ve hemodiyaliz hastalarından aktif sürveyans yapıldı ancak bu taramalarda klinik örneklerin laboratuvar sonuçlarında anlamlı bir VRE üremesi tespit edilmedi. Bu nedenle; 2015 yılından itibaren sadece nefroloji yoğun bakım ünitesinde aktif sürveyans yapıldı. Bunun dışında: rutin kültürlerde VRE üremesi saptanıp sürveyans kapsamına alınan hasta ve bu hastanın yattığı serviste yatan tüm hastalardan haftada bir olmak üzere 4 hafta rektal sürüntü alınarak takip edildi ve üst üste 4 negatiflik tespit edildikten sonra sürveyans kapsamından çıkarıldı. Ayrıca ilgili kliniklerde ortam kültürleri alındı. Alınan örneklerde VRE üremesi saptanan hastalar nozokomiyal enfeksiyon açısından irdelendi. Kolonizasyon/enfeksiyon ayrımı yapıldı. Belirtilen süre içinde hastane enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen VRE ile enfekte erişkin hastalar çalışmamıza dahil edildi.

Bu hastaların belirlenmesinde Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) izlem formları, Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans ve Kontrol Birimi (UHESKB) verileri dikkate alınmıştır. Hastane enfeksiyonları (HE) "Centersfor Disease Control and Prevention" (CDC) tanı kriterlerine göre tanımlanmış, tüm örnekler konvansiyonel kültür yöntemleri ile değerlendirilmiştir. HE olarak tanı almış olan VRE suşlarının anti mikrobiyal duyarlılıkları Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (Clinical and Laboratory Standard Institute, CLSI) önerilerine göre VITEK 2 Compact (Biomerieux, France) yöntemi ile çalışılmıştır. Hastaların fizik muayene bulgularına göre kültür örnekleri alınmıştır. Ateş 38 °C'nin üzerinde kan kültürleri tekrarlanmıştır. Hastanın muayene bulgularına göre boğaz kültürü, kateter kültürü, idrar kültürü, trakeal aspirat kültürü, bronkoalveoler lavaj kültürü alınmıştır. Kültür sonuçları değerlendirilirken hastaların fizik muayene bulguları biyokimyasal ve hematolojik tetkik sonuçları, radyolojik görüntüleme yöntemleri birlikte değerlendirilerek konulmuştur. Elde edilen veriler Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı düzeyinde hastaların klinik tabloları ile birlikte yorumlanarak hastane enfeksiyon kriterlerine uyan hastalar kaydedilmiştir.

## Bulgular

Hastanemizde kayda alınan yaklaşık beş yıllık tüm nozokomiyal enfeksiyonlarda (2835) etkenlerin %6,24'ü (177) enterokok spp.'ye bağlı bulundu. Hastaların %48,58'si (86) kadın, %51,42'si (91) erkek ve enterokok etkeninin %50,28'i (89) *E. faecium*, % 49,72'si (88) *E. faecalis* idi. Enfeksiyonların %54,8'i (97) YBÜ, %45,2'si (80) servislerde yatmakta idi. Enterokokların %57,63'ü (102) idrarda (% 47,05'i *E. faecium*, %52,95'i *E. faecalis*), %27,11'i (48) kanda, (%58,33'ü *E. faecium*, %41,67'si *E. faecalis*), %13,56'sı (24) yaranın akıntı ve sürüntü kültürlerinde (%50'si *E. faecium*, %50'si *E. faecalis*), %1,13'ü (2) solunum sekresyonunda, (%50'si *E. faecium*, %50'si *E. faecalis*), % 0,57'si (1) vajinal akıntı kültüründe (%100 *E. faecium*) üremiştir. Enterokok spp. saptanan nozokomiyal enfeksiyon sayıları tablo 1'de gösterilmiştir.

Çalışmamız için belirlenen sürede aktif süreyans yapılan nefroloji yoğun bakım ünitesi ve normal klinik örneklerde VRE saptandığı için yapılan süreyans taramalarında toplam 680 rektal sürüntü alındı. Bunların 39 tanesinde VRE üremesi oldu. Bu hastalar (HE) açısından (CDC) tanı kriterlerine göre irdelendi. Toplam 7 hasta VRE'ye bağlı nozokomiyal enfeksiyon kabul edildi. Belirlenen sürede kayda alınan 2835 nozokomiyal enfeksiyon irdelendiğinde VRE oranı % 0,24, enterokoklara bağlı nozokomiyal enfeksiyonlar içinde ise; % 3,4 olarak bulundu. VRE ye bağlı nozokomiyal enfeksiyon kabul edilen hastaların yaş aralığı: 24-80 (ortalama:63,4) idi. Enfeksiyonların; 1'i kan dolaşımı, 6'sı idrar yolu enfeksiyonu olarak kaydedilmişti. VRE'lerin tümü *E. faecium* (%100) olarak saptandı. Hastaların 5'i ileri yaşta (>70 yaş), 4'ünde ABY veya KBY, 1'inde kc sirozu, 1'inde malignite, 1'inde romatolojik hastalık, 2'sinde KOAH yada solunum yetmezliği gibi komorbid hastalık mevcuttu. Ayrıca, uygulanan invaziv girişimler açısından bakıldığında; hastaların hepsinde (%100) üriner ve santral venöz kateter kullanımı, %42,85'inde TPN kullanımı mevcuttu. %42,85'i mekanik ventilatörde takipli, %28,57 hasta hemodiyalize giriyordu. Hastaların hepsi uzun

süre hastanede yatmış ve bunların da 6 tanesi YBÜ'de takip edilmişti. Hastanede yatış günü ortalama 65,8 gün idi. Ayrıca kendi içlerinde de yatış süresi daha uzun olanların hayatta kalma oranı daha düşüktü. VRE enfeksiyonu öncesinde glikopeptid kullanımı %42,85 olup, hastaların %100'ü önceden 3. kuşak sefalosporin kullanmıştı.

VRE'a bağlı nozokomiyal enfeksiyon alınan hastaların komorbidite ve invaziv girişimlerinin sebepleri tablo 2'de ayrıntılı olarak verilmiştir.

VRE üreyen hastaların antimikrobiyal duyarlılığına bakıldığında; tüm etkenlerin vankomisin yanında teikoplanine de dirençli, linezolid, daptomisin ve tigesikline invitro duyarlı olduğu görüldü. Hastaların %71,42'si linezolid, %28,58'si daptomisin verilerek tedavi edildi. Tedavi sonrası %71,42'si ex oldu. % 28,58'i iyileşti. Nozokomiyal enfeksiyon etkeni enterokok spp.'lerin antimikrobiyal direnç oranları tablo 3'de gösterilmiştir.

## Tartışma

Enterokoklara bağlı enfeksiyonların sıklıkla hastanın kendi florasından kaynaklandığı düşünülmeyle birlikte, çoklu ilaç direncinin artması, yeni epidemiyolojik çalışma sonuçları, sağlık personelinin elleri ve çevrede tespit edilmeleri bunların nozokomiyal yayıldığını göstermektedir (6). Tüm nozokomiyal enfeksiyonlar arasında enterokoklara bağlı enfeksiyonların oranı % 3-10, *E. faecium* oranı; üriner sistemin nozokomiyal enfeksiyonları arasında %36,3, CAI ları arasında %9,5 olarak saptanmıştır (7) Çalışmamızda da benzer şekilde enterokoklara bağlı nozokomiyal enfeksiyon oranı 177/2835 (%6,2) idi. Aykut-Arca ve ark.'nın yaptığı çalışmada *E. faecalis* suşları % 13,48 ile en sık idrardan, ikinci sıklıkta (% 12,3) yara örneklerinden izole edilmiştir (8). Mert-Dinç ve ark.'nın yaptığı çalışmada *E. faecium* % 100 oranında idrardan izole edilirken, *E. faecalis* en sık kanda (% 62,5) saptanmış idrarda hiç saptanmamıştır (9). Yine M. Aral ve arkadaşlarının çalışmasında diğer çalışmalarla uyumlu olarak *E. faecium* % 59, *E. faecalis* % 55 oranlarıyla en sık idrarda

**Tablo 1. Enterokok spp. saptanan nozokomiyal enfeksiyon sayısı**

Enterokok üreyen vücut bölgeleri n:177	İdrar	Kan	Yara	Solunum sekresyon	Vajinal akıntı	Toplam
<i>E. faecium</i>	%47,05 (48)	%58,33(28)	%50(12)	%50(1)	%100(1)	%50,28(89)
<i>E. faecalis</i>	%52,95(54)	%41,67(20)	%50(12)	%50(1)	% 0	%49,72(88)
Toplam:%(n)	%57,63(102)	%27,11(48)	%13,56(24)	%1,13(2)	%0,571	177

rastlanmıştır (10). Ülkemizde yapılan araştırmaların çoğunda enterokokların en sık idrardan izole edildiği belirtilmektedir (11). Gazi ve ark.'nın yaptığı çalışmada ise tam aksine idrardan en sık *E. faecalis* (%60) izole edilirken *E. faecium* sık (% 100) kateter ucundan, 2. Sıklıkta kandan (% 50) ve 3. sıklıkta idrardan (% 40) izole edilmiştir (12). Çalışmamızda ise nozokomiyal enterokok enfeksiyonları en çok idrarda; %57,63 (*E. faecium* %47,05, *E. faecalis* %52,95), ikinci olarak kanda (%27,11), üçüncü sıklıkta ise yara ve sürüntü kültürlerinde (%13,56) izole edilmiştir.

Günümüzde enterokoklara en etkili antibiyotikler teikoplanin ve vankomisin olmasına rağmen, son yıllarda vankomisine dirençli suşların sayısında önemli oranlarda artış olduğu bildirilmektedir. Kanada'da 2007-2011 yılları arasında yapılan 3. basamak hastanelerin değerlendirildiği bir surveyans çalışmasında VRE enfeksiyon oranı % 6 olarak

NHSN'in özellikle Avrupa'da antimikrobiyal direnç surveyans sistemi raporlarına göre VRE enfeksiyon oranı % 4 olarak bulunmuş olup bu oran ülkeden ülkeye değişmektedir (13). Fransa, İspanya ve İsveç'te % 1'in altında iken, Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve Birleşik Krallık'ta % 20'nin üzerindedir (14). Latin Amerika'da ve Asya'da sırası ile VRE enfeksiyon oranları % 12.9 ve % 11.9 şeklinde bildirilmiştir (15,16). Ülkemizde çok merkezli çalışmalar olmamasına rağmen bu oranın %1-2 olduğu bildirilmektedir (7). Gazi ve ark. enterokokların vankomisin direncini % 1 oranında saptamışlar ve dirençli suşların *E. faecium* olduğunu tespit etmişlerdir (12). Aral ve ark. nın çalışmasında *E. faecalis* suşları teikoplanin ve vankomisine % 100 duyarlıyken, *E. faecium* suşlarında bu antibiyotiklere sırasıyla % 6 ve % 7 oranlarında direnç göstermektedirler (10). Bununla birlikte Ulusoy ve ark.'nın ve Mert-Dinç ve ark.'nın çalışmalarında ise

**Tablo 2. VRE'a bağlı nozokomiyal enfeksiyon alınan hastaların komorbidite ve invaziv girişim sebepleri**

Cinsiyet	Yaş	Komorbidite	İnvaziv girişim	VRE enfeksiyonu	Öncesinde kullanılan antibiyotikler	yatış günü / VRE üremesi	Etken	Sonuç
E	86	Yaşlılık, YB yatışı, KBY, Beslenme bozukluğu	ÜK, SVK, Hemodiyaliz, Transfüzyon	Kİ-ÜSE	Seftriakson, moxifloksasin-pip-tazo, ertapenem, imipenem,	64/8	<i>E. faecium</i>	ex
K	24	YB yatışı, KBY, SLE,	ÜK,SVK, Hemodiyaliz transfüzyon	SVK-KDE	Seftriakson Meropenem, caspofungin, vankomisin	19/12	<i>E. faecium</i>	şifa
E	73	Yaşlılık, YB yatışı, KOAH, Solnm. yetm.	ÜK,SVK, Mekanik ventilasyon	Kİ-ÜSE	Seftriakson, meropenem, kolistin	64/41	<i>E. faecium</i>	ex
K	76	Yaşlılık, YB yatışı, Kc.sirozu	ÜK, SVK,	Kİ-ÜSE	Seftriakson, moxifloksasin, tigesiklin	145/88	<i>E. faecium</i>	ex
E	80	Yaşlılık, YB yatışı, Mesane CA KBY, Cerrhi girişim	ÜK, SVK, TPN kullanımı	CAE-ÜSE	Seftriakson, ciprofloksasin, metronidazol	19/16	<i>E. faecium</i>	ex
E	28	YB yatışı, Trafik kazası	ÜK,SVK, Mekanik ventilasyon, TPN kullanımı	Kİ-ÜSE	Seftriakson, meropenem, tigesiklin, sulperazon, moxifloksasin vankomisin	40/6	<i>E. faecium</i>	şifa
K	77	Yaşlılık, ABY	ÜK,SVK,, Mekanik ventilasyon, TPN kullanımı	Kİ-ÜSE	Seftriakson, moxifloksasin,ertapenem, tigesiklin, kolistin, vankomisin	210/70	<i>E. faecium</i>	ex

Tablo 3. Nozokomiyal enfeksiyon etkeni enterokok spp.'lerin antimikrobiyal direnç oranları:						
Enterokokus spp türü	<i>E. faecium</i> n:89 (%50,2)		<i>E. fecalis</i> n:88 (%49,8)		Total n:177 (%100)	
	Duyarlı n(%)	Dirençli n(%)	Duyarlı n(%)	Dirençli n(%)	Duyarlı n(%)	Dirençli n(%)
<b>Vankomisin</b>	82 (%92)	7(%8)	88(%100)	0(0)	%96,6	%3,4
<b>Teikoplanin</b>	82(%92)	7(%8)	88(%100)	0(0)	%96,6	%3,4
<b>Linezolid</b>	89(%100)	0(%0)	88(%100)	0(0)	%100	%0
<b>Tigesiklin</b>	89(%100)	0(%0)	88(%100)	0(0)	%100	%0

vankomisin direnci saptanmamış, 137 örneğin incelendiği bir çalışmada antibiyotik direnci gözden geçirilmiş ve vankomisin, teikoplanin, linezolid, tigesiklin, direnci saptanmamıştır (11,9,17). Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) verilerine göre hastane enfeksiyonu etkeni olan enterokok izolatlarında vankomisin direnci 2010 yılında % 11.2, 2011 ve 2012 yılında % 17.1, 2013 yılında % 21.3, 2014 yılında % 20.6, 2015 yılında ise % 14.3 olarak bildirilmiştir (18). Bizim çalışmamızda da enterokoklara bağlı tüm nozokomiyal enfeksiyonlar irdelendiğinde; VRE oranı % 0,24 ile Türkiye verilerinden biraz daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum VRE önlem paketlerine uyumun düzenli yapıldığını düşündürmekte olup, hastanemiz adına sevindiricidir. Hastanemizde VRE üreyen hastalar tek kişilik odalarda veya aynı şekilde üremesi olan hastalarla birlikte kohortlanarak izole edilmekte mümkünse erken taburculuk planlanmakta ve otomasyon sisteminde VRE kolonizasyonu ile ilgili uyarı verilmesi sağlanmaktadır. Hasta odalarına giriş ve çıkışlarda sıkı temas izolasyonu uygulanmakta ve taburculuk sonrası dezenfeksiyon usulünce 2 kez yapılmadan yeni hasta alınmamaktadır. VRE saptanan ortamlarda çevre kültürleri alınıp dezenfeksiyon titizlikle yapılmakta ve düzenli uygulanan el hijyeni, izolasyon, temizlik elemanlarına temizlik ve dezenfeksiyon eğitimleri Enfeksiyon Kontrol Komitesince tekrarlanmakta, bu kurallara uyum (haftada 2 gün izlenerek) ve nozokomiyal enfeksiyon oranları ilgili birimlere aktif anlatım şeklinde geri bildirilmektedir. Ayrıca YB ve hematoloji-onkoloji ünitelerinde periferik damar yolu açılması dahil tüm invaziv işlemlerde klorheksidin solüsyonu ile dezenfeksiyon yapılmaktadır.

Yine çalışmamızda literatürle uyumlu olarak *E. faecalis* vankomisin, teikoplanin direnci saptanmazken, *E. faecium*da % 7,5 oranında direnç saptanmıştır. *E. faecium* suşlarında görülen direnç oranlarının yüksek olması dikkat çekicidir.

Linezolid oksazolidinonlar sınıfından yeni bir antibiyotik olup klinik açıdan önemli tüm Gram pozitif bakterilere karşı mükemmel in-vitro aktiviteye sahiptir. Linezolid direncinin (enterokok enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan diğer antimikrobiallerin aksine) *E. faecalis* suşlarında *E. faecium* suşlarına göre daha fazla olduğu bildirilmiştir.(19). Oysaki Bizim çalışmamızda tüm enterokoklar linezolid ve daptomisine duyarlı bulunmuştur.

1989 dan beri ABD' VRE kolonizasyon ve enfeksiyonlarının özellikle yoğun bakım ünitelerinde 34 kat olacak şekilde hızlı bir şekilde arttığı bildirilmektedir. Ayrıca direnç genleri *S. aureus* gibi diğer gr pozitif koklara aktarılabildiğinden vankomisin kullanımında akılcı davranılması gerektiği vurgulanmaktadır. Hastane enfeksiyonlarının tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmadığı gibi tıbbi teknoloji ve invaziv girişim uygulamalarındaki artış hastane enfeksiyonu riskini daha da arttırmaktadır. enfeksiyon kontrol programlarının uygun şekilde yapılması ile hastane enfeksiyonlarının en az 1/3'ünün önlenilebileceği bilinmektedir (20,21).

VRE ye bağlı nozokomiyal enfeksiyonu olan hastaların risk faktörlerine baktığımız zaman; hepsinde ileri yaş, Akut veya kronik renal yetmezlik, uzun süre hastanede özellikle yoğun bakım veya onkoloji kliniklerinde yatmış olmak, immunsupresyon, nötropeni, daha önceden vankomisin, seftazidim, siprofloksasin, metronidazol gibi antibiyotik kullanımı, yakın zamanda ameliyat geçirmek, VRE ile kolonize veya enfekte bir hastanın yakınında yatmak veya bunlara bakım veren bir hemşireden bakım almak gibi faktörlerden biri veya birkaçının var olduğunu görürüz. M. Aral ve arkadaşlarının çalışmasında hastaların kronik böbrek yetmezliğine sahip olması ve öncesinde antibiyotik kullanım öykülerinin olması, olası risk faktörleri olarak değerlendirilmiştir (10). Atalay ve arkadaşlarının çalışmasında ise %31,6 ABY veya KBY, %26,3 geçirilmiş operasyon, %89,5 SVK, mekanik

ventilatörde takip, NG kullanımı ve %100 üriner kateter kullanımı saptamışlar (22). Bizim hastalarımızın yaş aralığı: 24-80 (ortalama:63,4) olup 5 tanesi ileri yaşta (>70 yaş), hepsi uzun süredir hastanede yatmakta idi, 6 tanesi yoğun bakımda yatmakta, hastaların 4 tanesinde ABY veya KBY, 1 hastada kc sirozu, 1 hastada malignite, 1 hastada romatolojik hastalık, 2 hastada KOAH yada solunum yetmezliği gibi immunosupressif bir durum mevcuttu. Ayrıca, uygulanan invaziv girişimler açısından bakıldığında; hastaların hepsinde üriner ve santral venöz kateter kullanımı mevcuttu. 3 hasta TPN kullanmıştı, 3 hasta mekanik ventilatöre bağlanmıştı ve 2 hasta hemodiyalize giriyordu. Hastaların hepsi öncesinde 3. kuşak sefalosporin,3 hasta glikopeptid kullanmıştı. Tıpkı çalışmalarda olduğu gibi hastaların hepsinde bir veya birden fazla komorbid hastalık ve birden fazla risk faktörü mevcuttu. Atalay ve ark'nın yaptığı çalışma ile benzer şekilde hastalarımızın tümünde üriner kateter uygulaması mevcuttu ve ABY veya KBY (%57,1) benzer şekilde yüksek oranda eşlik ediyordu.

---

## Sonuç

Çalışmamızın sonunda; gerek aktif sürveyans ile takip edilen hastalar, gerekse üreme durumuna göre sürveyans programına alınan hastalarda hem VRE üreme oranı hem de nozokomiyal VRE enfeksiyonları Türkiye ve Dünya verilerinden oldukça düşük bulunmuştur. Bu durum Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesinin özverili çalışması, çalışanların önerilere uygun davranması, uygun yerde uygun dezenfektan kullanımı, gereksiz uzun süreli yatışların ve gereksiz antibiyotik kullanımının mümkün olduğunca önlenmesi ile ilişkilendirilmiştir. Risk faktörlerinin ve hazırlayıcı etkenlerin belirlenmesi aktif sürveyans ile kolonize ve enfekte hastaların tespiti ve gerekli izolasyon önlemlerinin alınması, ayrıca sağlık personelinin bu konuda eğitilerek el yıkama, eldiven giyme ve uygun dezenfeksiyon yöntemlerinin uygulanması önemlidir. Hastanemizde olduğu gibi bu önlemleri uygulayarak VRE oranlarını düşürmek mümkündür.

## Kaynaklar

- Durmaz G (2017). Enterokoklar. Ayşe WilkeTopçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay (Editors). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi (2017:1797-1803).
- Bulut A, Şengül H, Kaşıkçı ÖH. Vankomisine Dirençli Enterokok Sürveyans Çalışması: Bir Devlet Hastanesi Örneği. JAREN 2018;4(1):21-27. Doi:10.5222/Jaren. 2018.021.
- Woodford N, Johnson AP, Morrison D, David C, Speller E. Current perspectives on glycopeptide resistance. *Clinical Microbiology Reviews*. 1995Oct; 8(4): 585-615.
- Klimik (2010).Metisilin Dirençli Stafilokoklar ve Vankomisin Dirençli Enterokoklar Epidemiyoloji Laboratuvar Tanı. Antimikrobiyal Direnç Hızları.http://www.rshm.gov.tr/enfeksiyon/dosya/analiz2010.
- Sümerkan B. Vankomisine dirençli enterokoklar. In:Günaydın M, Esen Ş, Sanıç A, Leblebicioğlu H, eds. Editors. Sterilizasyon Dezenfeksiyon ve Hastane İnfeksiyonları Samsun:Samsun İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Araştırmaları Derneği 2002: 329-334.
- Chenoweth C.,Schaberg D. Theepidemiology of enterococci. *Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis*. 1990; 9: 80 – 9.
- Karahocagil M K, Yaman G , Göktaş U, Sünnetçioğlu M, Çıkman A, Bilici A. Hastane Enfeksiyon Etkenlerinin ve Direnç Profillerinin Belirlenmesi. *Van Tıp Dergisi*. 2011;18(1):27-32.
- Aykut Arca E, Mert Dinç B, Karabiber N. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen enterokok türlerinin kliniklere dağılımı. *Türk Hij DenBiyolDerg*, 2009; 66 (1): 1-5
- Mert-Dinç B, Aykut-Arca E, Yağcı S, Karabiber N. Çeşitli Klinik örneklerden izole edilen Enterococcus faecalisve Enterococcus faecium suşlarında in-vitro antibiyotik duyarlılığı. *Türk Hij Den BiyolDerg*, 2009;66(3): 117-21.
- Aral M, ,Ece Paköz Nİ, Aral I, Doğan S. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Enterococcus faecalis ve Enterococcus faecium suşlarının antibiyotik direnci. *TürkHij Den Biyol Derg*: 2011; 68 (2): 85 – 92
- Ulusoy S. Yoğun bakım ünitesinde Gram-pozitif mikroorganizmalar ve direnç sorunu. *Yoğun Bakım Dergisi*. 2003; 3(2): 118-28.
- Gazi H, Kurutepe S, Sürücüoğlu S, Ecemiş T, Özbakkaloğlu B. Hastane kökenli Enterococcus faecalisve Enterococcus faecium suşlarında antimikrobiyal direnç. *Ankem Derg*, 2004; 18(1): 49-52.
- Zhanel GG, Adam HJ, Baxter MR, Fuller J, Nichol KA, DENisuiK AJ,et al. Antimicrobial susceptibility of 22746 pathogens from Canadian hospitals: results of the Canward 2007–11 study. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, 2013;68:7-22.
- The European Antimicrobial Resistance Surveillance System EARS-Net Results. (2015).Available from: [http://www.ecdc.europa.eu/en/health\\_topics/antimicrobial\\_resistance/database/Pages/database.aspx](http://www.ecdc.europa.eu/en/health_topics/antimicrobial_resistance/database/Pages/database.aspx).
- Cattoir V, Leclercq R. Twenty-fiveyears of shared life with vancomycin-resistant enterococci :is it time todivorce? *Journal of Antimicrobial Chemotherapy* 2013;68:731-742.
- O'Driscoll T, Crank CW. Vancomycin-resistant enterococcal infections: epidemiology, clinical manifestations, and optimal management. *Infection and drug resistance* 2015;8:217-230. Doi:2147/IDR.S54125
- Aktepe O, Aşık G, Çiftçi İ.H, Çetinkaya Z. Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterokok suşlarının Antibiyotik Direnç Oranları. *Türk Mikrobiyoloji Cem Derg* 2011; 41(2): 86-90
- Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Raporu, Özet veri (2011-2015). <http://uhes.saglik.gov.tr/UHESA>
- Tünger A, Aydemir S, Uluer S, Cilli F. Invitroactivity of linezolid&quinupristin / dalfopristin against Gram-positive cocci. *Indian J MedRes*. 2004Dec; 120(6): 546-52
- Semio annual report, Aggregated Data fromthen National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) System December 1999Dec; 27(6):520-32.Doi:10.1016/s0196-6553(99)70031-3.
- Pfoller MA, Korten V, Janes RN, Doern GV, Multicenter evaluation of the antimicrobial activity – for seven broad spectrum beta-lactams in Turkey using the Etest method. *Turkish Antimicrobial Resistance Study Group. Diang microbial infect Dis*1999 ; 35; 65-73.
- Atalay S,Ece G, Şamlıoğlu P, Maraş G, Köse I, Köse Ş, İzmirde Üçüncü Basamak bir Hastanede görülen VRE Olgularının Değerlendirilmesi. *Mikrobiyoloji bul* 2012; 46(4)553-559.